# Surveillance du traitement inducteur de l'ovulation

ECHOGRAPHE : KONTRON 8000 EX
Mis en service le 01/10/2002

CYCLE N° pour IAC - IAD - FIV - GIFT - ICSI - STIMULATION - TEC

Madame / Monsieur

*Clinique St Antoine*
*Centre agréé de P.M.A*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jour du cycle** | 1ER JOUR DES REGLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jour du mois** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| traitement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRISE DE SANG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OESTRADIOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGESTERONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ECHOGRAPHIE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pratiquée par : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.D | 20+ mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 ou 18 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 ou 16 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 ou 14 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 ou 12 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 ou 10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O.G | 20+ mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 ou 18 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 ou 16 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 ou 14 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 ou 12 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 ou 10 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coh. | Nbre cohorte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Taille cohorte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muqueuse utérine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pathologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |